

## رازداری در گزارشات اتوپسی بیماران HIV مثبت

- پزشکان باید آلودگی متوفی به HIV را در صورت احراز، در گزارشات اتوپسی با لحاظ بیشترین حد رازداری ثبت کنند.
- پزشکانی که اتوپسی می‌کنند یا افرادی که به نتایج اتوپسی درباره‌ی وضعیت HIV بیمار دسترسی دارند به نکات زیر توجه باید داشته باشند:
  - **ü** آلودگی به HIV و ابتلا به ایدز به مقامات مسؤول بهداشتی جامعه گزارش شود.
  - **ü** به افراد دیگری که ممکن است در اثر تماس با فرد فوت شده‌ی مبتلا، آلوده شده باشند اطلاع داده شود.
  - **ü** کسانی که اطلاع رسانی به آنها ضروری می‌نماید در جریان قرار گیرند (مثل مسئولین غسل و کفن، کادر خدمات درمانی که در مراقبت از بیمار دخالت داشته‌اند)
- گزارش اتوپسی بیماران HIV مثبت همچون سایر گزارش‌های پزشکی متوفی بوده و باید محرمانه نگهداری شود. پزشک وظیفه اخلاقی دارد که این موضوع را به مقامات قانونی مسؤول و افراد در معرض خطر (مثل شرکای جنسی و افرادی که از سرنگ مشترک استفاده می‌کرده‌اند) اطلاع دهد. در صورتی که قسمتی از بدن فرد متوفی برای استفاده در پیوند برداشته می‌شود، اطلاع به مؤسسات مسؤول تدارک بافت یا ارگان نیز ضروری است.
- در موارد مرگ مشکوک، ناگهانی یا به دلیل نامشخص که در اتوپسی، HIV مثبت گزارش می‌شود، باید وضعیت HIV محرمانه نگه داشته شود تا در دسترس عموم نباشد.